

### **Conversia în colecistita acută abordată laparoscopic**

A. Spătariu, A.E. Nicolau, M. Beuran, C. Tudor, C. Oprescu  
Clinica de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgență București

#### **Rezumat**

**Introducere:** Conversia este renunțarea la tehnica laparoscopică și continuarea intervenției în manieră convențională, deschisă indiferent de motiv și de momentul operației.

**Scop:** Evaluarea cauzelor și momentului conversiei, tehnica colecistectomiei după conversie, analiza experienței echipei chirurgicale în deciderea momentului conversiei.

**Metoda:** Studiu retrospectiv la pacienții operați pentru colecistită acută prin abord laparoscopic în perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2007. S-au evaluat examenul clinic, analizele de laborator, protocoalele operatorii, rezultatele buletinelor histopatologice ale pieselor și evoluția postoperatorie.

**Rezultate:** La 108 pacienți din totalul de 1522 de colecistectomii laparoscopice pentru colecistită acută (7,1%) s-a decis conversia la operația deschisă. Analizând experiența echipei operatorii constatăm predominanța colecistectomiilor laparoscopice convertite de medicii primari asistați de medicii specialiști – 43% (46/108), cele mai puține fiind înregistrate de medicii rezidenți asistați de medicii primari – 22% (25/108). Plastronul organizat fibros nedisecabil, pediculita lemnoasă, aderențele după laparotomie anterioară, suspiciunea de fistulă, se detașează net de restul indicațiilor de conversie, cu o pondere de 45,35% (49/108). Repartiția pe sexe a bolnavilor la care s-a practicat conversia arată o diferență semnificativă: 5,39% (60/1112) la femei și 11,7% (48/410) la bărbați. Rata de conversii a fost semnificativ mai ridicată, pentru operațiile efectuate la peste 96 ore de la debutul simptomatologiei clinice – 15,1% (29/192). Cele mai multe conversii au apărut în cazul colecistitei acute gangrenoase 72% (77/108). 82,40% din totalul colecistitelor acute care au fost convertite erau plastronate (89/108).

**Concluzii:** Conversia în colecistectomia laparoscopică pentru colecistita acută reprezintă o dovadă a maturizării și răspunderii profesionale, este o soluție viabilă în situații în care avantajul abordului laparoscopic este depășit de riscurile unor situații întâlnite în practică; colecistita acută gangrenoasă reprezintă o cauză importantă de conversie – 72%; plastronul pericolecistic a fost convertit în 82,4% din cazuri; conversia este mai frecventă la bărbați – 11,7%; colecistitele acute cu debut peste 96 ore sunt convertite în 15,1%.

**Cuvinte cheie:** colecistita acută, colecistectomie laparoscopică, conversie

Correspondență: Dr. A.E. Nicolau, Clinica de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgență, București  
E-mail: anicolau@easynet.ro