

**Sindromul de venă cavă superioară - variantă terapeutică**

N. Galie<sup>1</sup>, R. Vasile<sup>2</sup>, C. Savu<sup>1</sup>, C. Petreanu<sup>1</sup>, V. Grigorie<sup>1</sup>, E. Tabacu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Secția de Chirurgie Toracică, Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", București

<sup>2</sup>Institutul de boli cardiovasculare "C.C. Iliescu", București

**Rezumat**

Pacient în vârstă de 52 ani, fumător a fost internat în urgență cu cefalee, dispnee, edem și cianoză la nivelul extremității cefalice și a membrelor superioare, sugerând un sindrom de venă cavă superioară. Investigațiile paraclinice au confirmat prezența unei tumori mediastinale și a unei adenopatii asociate localizate în loja Bariety, cu tromboză la nivelul venei cave superioare. Pacientul a fost operat prin sternotomie mediană totală realizându-se excizie completă tumorală și cavotomie longitudinală pentru extragerea trombului intracav. Diagnosticul histologic al tumorii mediastinale a fost de adenocarcinom tubular papilar moderat diferențiat. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă cu remisie completă a sindromului de venă cavă superioară. Controlul prin CT scanare la 9 luni nu a indicat recidiva locală, iar fluxul sanguin a fost normal prin vena cavă superioară. Cuvinte cheie: venă cavă superioară, sindrom

Correspondență: Conf. Dr. Nicolae Galie

Secția de Chirurgie Toracică, Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", București

E-mail: nicolae\_galie@yahoo.com