Chirurgia (2010) 105: 855-858

Chist al mezocolonului descendent

Gh. Ghidirim, I. Mișin, S. Ignatenco, E. Șor
Catedra Chirurgie nr. 1 “Nicolae Anestiadi”, Laboratorul Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliarã, Universitatea de Stat de Medicinã şi Farmacie “Nicolae Testemițanu”, Centrul Național Ştiințifico-Practic Medicinã de Urgențã, Chişinău, Moldova

Rezumat
Chisturile mezenteriale reprezintã o patologie rarã în abdomen. Fiind în majoritate asimptomatice, sunt descoperite accidental la ultrasonografie și/sau în timpul scanării la tomografie computerizatã (TC). Tratamentul chirurgical optimal este excizia completã a chistului. Prezentãm cazul clinic a unei paciente în vârstã de 36 ani cu chist al mezocolonului descendent. Analizele de laborator normale. La TC cu contrast s-a observat prezența chistului 14,0 x 8,3 x 9,4 cm, densitate 26 – 29 HU, situat retroperitoneal. Intraoperator s-a constatat prezența chistului, cu proveniență din mezoul sigmei, ce a fost extirpat în totalitate. Autorii discutã aspecte cu privire la simptomatologie, complicații, clasificare și metode de tratament al chisturilor mezenteriale în contextul datelor din literaturã.
Cuvinte cheie: chist mezenterial, colonul descendent

Corespondențã: Conf. Dr. Igor Mişin
Str. Munceşti 52, ap. 60, 2001, Chişinău, Moldova
Tel: (+37322) 83-24-65, Fax: (+37322) 52-20-08
E-mail: mishin_igor@mail.ru