

Abordul laparoscopic în urgență combinat cu radiofrecvență în scop de hemostază după puncția biopsie hepatică

R. Seicean¹, V. Bințișan¹, A. Seicean², R. Scurtu¹, C. Ciuce¹

¹First Surgical Clinic, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, Romania

²Third Medical Clinic, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

În literatură nu există date despre utilizarea radiofrecvenței (RFA) prin abord laparoscopic în urgență ca și modalitate de realizare a hemostazei după puncția-biopsie hepatică. În această lucrare descriem cazul unei paciente cu macro-

globulinemie Waldestrom și tumoră hepatică voluminoasă, hipervascularizată, care a dezvoltat o hemoragie severă după puncția-biopsie hepatică. Metoda originală de tratament minim-invaziv a constat într-un abord laparoscopic, cu introducerea trans-cutanată a sondei de radiofrecvență la nivelul orificiului biopsiei. Chiar în condițiile unei coagulări deficitare, hemostaza este sigură și rapid instalată. Abordul laparoscopic combinat cu radiofrecvență evită o laparotomie inutilă în cazul hemoragiilor cu sursă cunoscută, putând constitui o metodă optimă de asigurare a hemostazei, inclusiv la pacienții pentru care biopsia percutanată ar fi o procedură riscantă.

Cuvinte cheie: laparoscopie, urgență, radiofrecvență, biopsie hepatică, hemoragie

Corresponding author: Radu Seicean, M.D., Ph.D.

First Surgical Clinic, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu",
Cluj-Napoca, 5, Clinicilor street, 400006, Cluj-Napoca, Romania

Fax: +4-0264-484990

Email: rseicean@yahoo.com