

Cancer de pancreas complicat cu infarct și abces splenic

G. Çipe¹, V. Genç², A. Çakmak², E. Kuterdem²

¹Department of General Surgery, Bezmialem Vakif University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

²Department of General Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

Rezumat

Atât diagnosticul cât și tratamentul adenocarcinomului generat de coada pancreasului, sunt dificile. Deși sunt progrese tehnice și de tratament, prognosticul rămâne infaust. După diagnostic, în mod caracteristic, supraviețuirea în medie este de 5-8 luni de zile. Atât infarctul cât și abcesul de splină, sunt complicații destul de rare ale cancerului de pancreas. În cazul existenței infarctului de splină, trebuie să se cerceteze cu atenție posibilele surse de embolie. În plus, abcesul splenic trebuie suspectat la pacienții cu infarct splenic, în special dacă semnele de infecție persistă în condițiile unui tratament adecvat. Diagnosticarea și tratamentul rapid sunt esențiale, deoarece s-a dovedit că situația este cu risc vital crescut. Aici a fost prezentat un pacient cu infarct și abces de splină care a apărut ca o complicație a cancerului de coadă de pancreas. Tratamentul ales a fost pancreatectomie distală și splenectomie. Examenul clinic și imagistic, modificările descoperite în diagnosticul diferențial a leziunilor de pancreas și de splină, impune luarea în discuție la un pacient cu stare septică a acestui gen de patologie. Variabilitatea clinico-imagistică impune luarea în discuție a acestei patologii în diagnosticul diferențial al multor leziuni splenice și pancreatice.

Cuvintele cheie: tumorile de pancreas, splină, abces, infarct

Corresponding author: Gökhan Çipe, MD.

Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine
Adnan Menderes Bulvarı, Fatih/Istanbul, Turkey
Tel.: +90 212 4531700,
Fax: +90 212 4533563
E-mail: gokhancipe@hotmail.com