

Eficacitatea simpatectomiei lombare laparoscopice pe cale transperitoneală - analiza a 100 cazuri

V. Bâtcă¹, N. Jitea², O. Albita³, T. Bîtcă⁴, D. Mănuș⁵

¹Universitatea Titu Maiorescu, București, România

²Clinica Chirurgică Spitalul Colțea, București, România

³Clinica Chirurgie II Spitalul Clinic de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București, România

⁴Centrul de Studii Clinice Parexel

⁵Catedra de biostatistică, UMF "Carol Davila" București, România

Rezumat

Simpatectomia lombară, tehnică chirurgicală clasică aplicată în tratamentul arteriopatiilor, a căpătat noi valențe în urma dezvoltării chirurgiei laparoscopice. Într-un interval de zece ani (2000-2009), la un număr de 100 pacienți s-au efectuat simpatectomii lombare laparoscopice pe cale transperitoneală, pacienți cu afecțiuni arteriopatice de etiologie variată. Vârsta medie a fost de 62 ani. Stabilirea indicației operatorii s-a realizat printr-un protocol de investigații care a ținut cont de criteriile clinice și paraclinice. Evoluția postoperatorie a fost simplă, cu morbiditate și mortalitate zero. Evoluție bună au avut pacienții în stadiile II și III de boală, cu dispariția claudicației și a durerilor de repaus. Rezultate nefavorabile s-au înregistrat la stadii avansate ale bolii, la diabetici cu numeroase afecțiuni asociate, în consecință 9 pacienți suferind amputații de membre. Rezultatele imediate și tardive s-au corelat cu stadiul afecțiunii și cu vârsta pacienților. Simpatectomia lombară laparoscopică pe cale transperitoneală, reprezintă o alternativă în tratamentul arteriopatiilor datorită morbidității reduse postoperatorii, reprezentând o șansă pentru pacienții arteritici.

Cuvinte cheie: simpatectomie, trombangeită Burger, claudicație, cale transperitoneală

Correspondență:

Dr. Viorel Bâtcă

Universitatea Titu Maiorescu, București, România

E-mail: batcaviorel@yahoo.com