

Chistul hidatic al mediastinului anterior

C. Motaș, N. Motaș, M. Davidescu, O. Rus, T. Horvat

Clinica de Chirurgie Toracică, Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu", București, România

Introducere: Boala hidatică este endemică în România. Deși leziunile se pot întâlni practic în orice organ sau segment anatomic, cele mai frecvente sunt hepatice și pulmonare. Chistele hidatice mediastinale sunt extrem de rare, fiind relativ puține descrieri în literatura de specialitate.

Material și metodă: Între 1994 și 2011 au fost diagnosticați și tratați chirurgical în Clinica de Chirurgie Toracică II UMF "Carol Davila" 3 pacienți cu chiste hidatice mediastinale, 2 bărbați și 1 femeie, având vârstele de 20, 37 și, respectiv, 52 de ani. Chistele au fost localizate în mediastinul anterior și au fost solitare la momentul diagnosticului.

Rezultate: Într-un caz diagnosticul a fost precizat preoperator, celelalte fiind descoperiri intraoperatorii. Abordul chirurgical a fost prin toracotomie; un chist era neviabil (chist hidatic timic) și s-a practicat chistectomie ideală, iar 2 chiste erau necomplicate. S-a înregistrat o singură complicație postoperatorie, embolie gazoasă cerebrală, remisă prin tratament medical; cauza a fost folosirea intraoperatorie a H₂O₂ ca agent scolicid.

Concluzii: Deși extrem de rar întâlnite în practică, chistele hidatice mediastinale trebuie luate în considerare în evaluarea unui pacient cu formațiune la nivelul mediastinului anterior. Tratamentul de elecție este cel chirurgical; acesta, împreună cu tratamentul paraziticid postoperator, sunt singurele care asigură vindecarea completă a acestor pacienți.

Cuvinte cheie: chist hidatic, tumoră mediastin, mediastin anterior

Correspondență:

Dr. Cezar Motaș

Clinica de Chirurgie Toracică IOB

Șoseaua Fundeni Nr. 252, Sector 2, RO-022338, București, România

E-mail: cezarmotas@gmail.com