

Chisturi hidatice cu localizare sincronă - hepatică și pelvină

H. Doran, O. Mihalache, Tr. Pătrașcu

Clinica de chirurgie "Prof. I. Juvara", Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino", București, România

Chisturile hidatice sunt localizate în 75% din cazuri la nivel hepatic, fiind de cele mai multe ori unice. Localizările extrahepatice constituie descoperiri pre- și intra-operatorii rare și sunt, de regulă, secundare celor hepatice. Prezentăm cazul clinic al unei paciente de 28 de ani, la care examenul genital a descoperit o tumoră pelvină. Echografia abdominală și tomografia computerizată au evidențiat două tumori chistice: una de 17/10 cm, dezvoltată la nivelul lobului hepatic stâng, cu material hidatic flotant în interior și una de 12/11 cm în pelvis, care amprenta vezica urinară, uterul, colonul sigmoid și rectul. Intra-operator: diagnosticul de chist hidatic a fost confirmat, identificându-se un chist de 20/15 cm, care ocupa practic în întregime lobul hepatic stâng, cu vezicule-fiice în interior. După aspirarea conținutului și inactivarea sa chimică, chistul a fost dezoperat și drenat la exterior cu 2 tuburi. În pelvis a fost identificat un alt chist hidatic voluminos, rezolvat în aceeași manieră. După 2 zile, exteriorizarea de bilă pe tubul de dren a stabilit existența unei fistule biliare externe, cu debit mediu, de 300-400 ml/zi. Fistulografia a confirmat comunicarea dintre cavitatea restantă și căile biliare. Rezolvarea a necesitat papilosfincterotomie endoscopică, care a fost urmată de evoluție favorabilă - reducerea progresivă a debitului și închiderea fistulei. Pornind de la criteriile din literatură, sunt discutate metodele de tratament și evoluția chisturilor hidatice extrahepatice. Cuvinte cheie: chist hidatic extrahepatic, fistulă biliară externă

Correspondență:

Dr. Horia Doran

Clinica de chirurgie "Prof. I. Juvara", Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"

Str. Ion Movilă, nr. 5-7, București

E-mail: doranh2003@yahoo.com