

### **Utilizarea allogrefelor în cura chirurgicală a herniilor hiatale voluminoase**

M. Tănase<sup>1</sup>, S. Marin<sup>1</sup>, S. Amza<sup>1</sup>, A. Toader<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Secția Chirurgie I, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Carol Davila", București, România

<sup>2</sup>Secția Chirurgie Cardio-vasculară, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Carol Davila", București, România

#### **Rezumat**

Utilizarea allogrefelor în cura chirurgicală a herniilor hiatale voluminoase, reprezintă o temă de dezbatere de actualitate. Folosirea plaselor pentru întărirea hiatusului esofagian este o procedură eficientă ce reduce riscul recurenței. Pentru consoli-darea reparării primare a herniilor hiatale voluminoase, se folosesc în principal plase de tipul polipropilenă, politetra-flouretilenă și biomaterial. Există controverse cu privire la indicațiile folosirii plaselor, tipul de plasă și plasarea acestora. Deși folosirea plaselor este asociată cu o rată scăzută de recurență, au fost descrise de numeroși autori complicații de tipul: migrarea plaselor în esofag, cauzată de materialul alloplastic folosit pentru hiatoplastie, stricturi, disfagie, ulceratii, perforatii. Din experiență, o reparație cu plasă a herniei hiatale trebuie efectuată prin plasarea plasei (preferabil non-biologică) circumferențial, ancorată ferm la stâlpii diafragmatici. Plasarea corectă a plasei diminuează riscul de stricturi și eroziuni. Sunt necesare studii mai ales prospective ce ar putea clarifica metoda optimă de reparare a herniilor hiatale voluminoase.

**Cuvinte cheie:** hernie hiatală voluminoasă, allogrefă, complicații

Correspondență:

Dr. Mihai Tănase

Secția Chirurgie I, Spitalul Universitar de Urgență  
Militar Central "Carol Davila", București, România

E-mail: drmtanase@yahoo.com