

Factori prognostici pentru sarcoamele retroperitoneale primare și secundare. Impactul asupra abordării terapeutice

A.M. Lazar, E. Brătucu, N.D. Straja

Clinic of Surgery I, Bucharest Oncology Institute "Al. Trestioreanu", University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Bucharest, Romania

Rezumat

Există o cunoaștere prea limitată privind sarcoamele retro-peritoneale, dar persistă în schimb multe controverse. Obiectivul acestui studiu a fost definirea trăsăturilor comune și distincte ale sarcoamelor retroperitoneale primitive și secundare în termeni de prezentare, prognostic și abordare terapeutică în vederea îmbunătățirii managementului acestor tumori. Impactul implicării vasculare a fost evaluat pentru cele două grupe de pacienți.

Pacienți și metode: Am realizat un studiu retrospectiv și prospectiv pe un grup de 34 de pacienți diagnosticați cu sarcoame retroperitoneale primitive și secundare.

Rezultate: Noi am găsit că sarcoamele retroperitoneale primitive și secundare prezintă multe trăsături comune, dar și diferențiale din punct de vedere al manifestării, predictorilor supraviețuirii și tratamentului.

Discuții: Implicarea vasculară este unul dintre cei mai importanți predictorii pentru o supraviețuire redusă în cazul pacienților cu sarcoame retroperitoneale primitive, deoarece împiedică radicalitatea. În acest grup, radicalitatea este factorul major de prognostic pentru o supraviețuire mai îndelungată. În schimb, supraviețuirea în sarcoamele retroperitoneale secundare pare a fi mai puțin dependentă de radicalitatea tratamentului și răspunde la tratamente complementare.

Cuvinte cheie: retroperitoneal, sarcoame, supraviețuire, sarcoame retroperitoneale primitive, sarcoame retroperitoneale secundare, implicare vasculară, prognostic

Corresponding author: Lazar Angela Madalina M.D.

Clinic of Surgery I, Bucharest Oncology Institute "Al. Trestioreanu"

Fundeni Street, no 252, Bucharest, Romania

E-mail: angelalazar.2008@yahoo.com