

Cancerul colonului drept – particularități anatomo-clinice

R. Moldovanu¹, G. Dimofte¹, I. Ștefan¹, V. Filip¹, N. Vlad¹, G. Curcă¹, F. Crumpei², V. Fotea³,
D. Ferariu⁴, N. Dănilă¹, Șt. Georgescu¹, E. Târcoveanu¹

¹Clinica I Chirurgie, Spitalul "Sf. Spiridon", Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T. Popa" Iași, România

²Departamentul de radiologie, Spitalul "Sf. Spiridon" Iași, România

³Departamentul de radiologie, Spitalul "Sf. Spiridon", Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T. Popa" Iași, România

⁴Departamentul de anatomie patologică, Spitalul "Sf. Spiridon" Iași, România

Rezumat

Introducere: Cancerul colonului drept (CCD) prezintă unele particularități epidemiologie, clinice, de tratament și prognostic.

Material și Metodă: Am analizat retrospectiv pacienții operați în perioada 2004-2009 în Clinica I Chirurgie Iași, pentru o neoplazie localizată la nivelul colonului drept. Datele din foile de observație, protocoalele operatorii și buletinele anatomo-patologice au fost codificate alfa numeric, introduse într-o baza de date MS Access și analizate statistic.

Rezultate: Au fost incluși în studiu 219 pacienți cu CCD, reprezentând 24,17% din totalul cazurilor de cancer colorectal, mediana vârstei fiind de 66 ani. Tumora palpabilă a fost notată la 41,5%, iar anemia la 65,3%. Ecografia abdominală a fost efectuată la toți pacienții, sensibilitatea pentru diagnosticul pozitiv al tumorii primare fiind de 71,2%. Rezecabilitatea a fost de 89,5%. Incidentele/accidentele intraoperatorii au fost notate la 6,8% dintre pacienți. Morbiditatea postoperatorie a fost de 19,4% cu o incidență a fistulei anastomotice de 1,38% și o mortalitate de 2,77%. Supraviețuirea medie globală a fost de 40,13±1,93 luni (mediana: 49,26). Supraviețuirea a fost influențată atât de tipul histologic, stadiu și gradingul tumoral cât și de invazia vasculară și perineurală. De asemenea, invazia a peste 3 limfonoduli precum și rezecția a mai puțin de 11 limfonoduli au influențat negativ supraviețuirea.

Concluzii: CCD are o incidență în creștere și este apanajul persoanelor vârstnice. Rezecabilitatea CCD atinge 90% în condiții acceptabile de morbiditate și mortalitate. Supraviețuirea este influențată de invazia vasculară și perinervoasă dar și de numărul limfonodulilor invadați cât și de numărul limfonodulilor rezecați.

Cuvinte cheie: cancer de colon, colectomie dreaptă, supraviețuire

Correspondență:

Dr. Radu Moldovanu

Departamentul de chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie

"Gr.T. Popa" Iași

Bd. Independenței, Nr. 1, 700111, Iași, România

E-mail: rmoldovanu@gmail.com