

Rinoplastia reconstructivă în cazuri cu carcinom bazo-celular nazal

I. Anghel, A.G. Anghel

ENT Clinic "Coltea" Hospital, University of Medicine "Carol Davila" Bucharest, Romania

Rezumat

Carcinomul bazocelular este cel mai obișnuit tip de cancer al pielii, 85% fiind localizat în zona capului și gâtului din care 30% la nivelul piramidei nazale. Autorul prezintă un studiu retrospectiv, propria experiență, privind tratamentul chirurgical pe un lot de 31 cazuri cu carcinoma bazocelular de piramidă nazală, operate în perioada 2006-2011. Partea anatomică nazală cea mai frecvent interesată a fost zona alară, 58%, urmată de lobul 18%, perete lateral 12%, dorsum nazal 9% și 3% basalioma terebrans. În toate cazurile din acest studiu s-a practicat repararea defectelor tumorale cutanate ale nasului utilizând variate lambouri cutanate locale, grefe libere de cartilaj septal și auricular precum și grefe libere compuse (piele + cartilaj) din conca și marginea helixului. Metodele de tratament au depins de localizarea și extensia tumorală. Cea mai bună opțiune de tratament în carcinomul bazocelular nazal a fost excizia tumorală radicală cu margine de siguranță urmată de rinoplastie reconstructivă.

Cuvinte cheie: carcinoma bazocelular, rinoplastie reconstructivă, lambou cutanat local, lambou liber compus

Corresponding author: Ion Anghel MD, PhD

ENT Clinic, "Coltea" Hospital

University of Medicine "Carol Davila", Bucharest, Romania

Fax: 021-3202011

E-mail: ionangheldoc@yahoo.com