

Rolul evidențelor imagistice în diagnosticul supurațiilor pancreatice

V. Strâmbu¹, M. Brătucu¹, P. Radu¹, C. Iorga¹, D. Garofil¹, A. Cuibac², F. Popa²

¹Department of General Surgery, "Carol Davila" Nephrology Clinical Hospital, Bucharest, Romania

²Department of General Surgery, "St. Pantelimon" Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Autorii doresc să propună un protocol de interpretare a imagisticii dedicate supurațiilor pancreatice ce apar în pancreatita acută necrotico-hemoragică. Analizând datele din literatură privind modul de extensie al supurațiilor pancreatice, se avansează ideea conform căreia chirurgul trebuie el însuși să utilizeze și să interpreteze imagistica oferită. Folosindu-se de repere anatomice binecunoscute, evidențiabile pe imaginile și reconstrucțiile CT sau RMN, chirurgul este în măsură să aprecieze cât mai exact, pe bază de evidențe, raporturile și limitele colecțiilor supurative. Se obține astfel o hartă topografică cât mai precisă a zonelor supurative și se propune necesitatea de a ne raporta la spații retroperitoneale precis denumite, spații care fac parte din aria pararenală bilaterală. Astfel, se identifică repere anatomice lumenale, parenchimatoase și vasculare ce permit raportarea anatomică exactă a spațiilor retroperitoneale interesate de procesul patologic. Se creează astfel posibilitatea abordului chirurgical țintit, cu alegerea căilor de acces către zonele supurate în scopul evitării restanțelor și omisiunilor septice. Autorii propun în final raportarea imagistică la 13 arii retroperitoneale, arii care însumate sunt cuprinse sub denumirea de spațiu pararenal.

Cuvinte cheie: pancreatita acută supurată, supurație pancreatică, debridare, retroperitoneal, computer tomografie, reconstrucții coronale

Corresponding author: Mircea Bratucu, MD

Department of General Surgery "Carol Davila" Nephrology Clinical Hospital
Grivitei street, no. 4, sector 1, Bucharest, Romania
E-mail: bratucu_mircea@yahoo.com