

Sindromul de compartiment abdominal – complicație în chirurgia defectelor parieto-abdominale voluminoase

C. I. Mavrodin¹, G. Pariza¹, D. Ion¹, V. I. Antoniac²

¹Emergency University Hospital Bucharest, 3rd General Surgery Department, Bucharest, Romania

²Polytechnic University of Bucharest, Sciences and Material Engineering Faculty, Bucharest, Romania

Rezumat

Incidența hipertensiunii intraabdominale (HTIA) și a sindromului de compartiment abdominal (SCA) este subapreciată în chirurgia defectelor parieto-abdominale de mari dimensiuni, cu diametrul transversal maxim de peste 10 cm, acesta fiind considerat principalul factor de risc pentru dezvoltarea hiper-tensiunii intraabdominale, alături de restricția ventilatorie sub 60% și obezitate. Hipertensiunea intraabdominală înregistrează o prevalență de cel puțin 50% în rândul bolnavilor critici și a fost identificată ca factor de risc independent, amenințător de viață. Încă, medicii nu evaluează corespunzător și nu sunt conștienți de consecințele potențial letale ale hipertensiunii intraabdominale netratate. Aceste consecințe pot fi sindromul de compartiment abdominal, urmat de insuficiență organică multiplă și chiar moartea pacientului. Lucrarea dorește să evidențieze imperiozitatea recunoașterii în timp util a acestei patologii, ca factor cheie în managementul corect al acestor complicații.

Cuvinte cheie: sindrom de compartiment abdominal, hipertensiune intraabdominală, hernie incizională

Corresponding author: Carmen Mavrodin, MD

Emergency University Hospital Bucharest

3rd General Surgery Department

169 Splaiul Independentei, sector 5, Bucharest, Romania

E-mail: carmen_mavrodin@yahoo.com