

Ruptură spontană a unui chist hidatic splenic și anafilaxie la un bolnav cu boală hidatică multi-organ

V. Constantin^{1,2}, F. Popa^{1,2}, B. Socea^{1,2}, A. Carâp^{1,2}, C. Bălăău^{1,2}, I. Motofei^{1,2}, P. Banu^{1,2}, D. Costea¹

¹General Surgery Department, "Sf. Pantelimon" Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania

²"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, General Surgery Department, Bucharest, Romania

Rezumat

Chisturile hidatice ale splinei sunt rare, splina fiind al treilea viscer din punct de vedere al frecvenței afectat de Echinococcus Granulosus. Chisturile hidatice splenice sunt, de cele mai multe ori, însoțite de boală hidatică multi-organ. Diagnosticul se face des la investigarea unei splenomegalii sau întâmplător, în timpul unui alt consult. Diagnosticul se poate face și după ruptura chistului fie datorită unui traumatism (cel mai frecvent), fie spontan. Ruptura chistului hidatic splenic necesită terapie imediată și este un eveniment cu potențial fatal. De cele mai multe ori se soldează cu splenectomie. Prezentăm cazul unui pacient cu boală hidatică pluri-viscerală care s-a prezentat cu un chist hidatic splenic rupt și a dezvoltat fenomene de șoc anafilactic. Cazul a fost tratat prin splenectomie și a avut o evoluție favorabilă.

Cuvinte cheie: chist hidatic splenic, boală multi-organ, anafilaxie

Corresponding author: Alexandru Carâp, MD

"Sf. Pantelimon" Emergency Clinical Hospital Bucharest

General Surgery Department

E-mail: alexandru_carap@hotmail.com