

**Boala Buschke-Löwenstein – Condiloma Acuminata Gigant - un review al literaturii**

D. Spînu<sup>1</sup>, A. Rădulescu<sup>1</sup>, O. Bratu<sup>1,2</sup>, I.A. Checheriță<sup>3</sup>, A.E. Ranetti<sup>4</sup>, D. Mischianu<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Department of Urology, “Dr. Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

<sup>2</sup>Department of Urology, Clinical Department No. 3, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, “Dr. Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

<sup>3</sup>Department of Nephrology and Dialysis, Clinical Department No. 3, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, “Sf. Ioan” Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania

<sup>4</sup>Endocrinology Ward, “Dr. Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

**Rezumat**

*Premiză/Scop:* Boala Buschke-Löwenstein sau condilomatoza gigantă este o afecțiune rară, cu transmitere sexuală, evoluție lentă și cu tendința de a infiltra țesuturile adiacente, care netratată poate avea un prognostic sumbru. Elementul definitoriu este dezvoltarea uneia sau mai multor formațiuni tumorale vegetante, de mari dimensiuni, cu tendința la ulcerare.

*Material și Metodă:* Lucrarea de față tratează atât aspecte de etiopatogenie, cât și formele de abordare terapeutică folosite în managementul actual al acestei afecțiuni.

*Rezultate:* Chirurgia minim invazivă împreună cu terapia locală și sistemică este adecvată în cazul pacienților cu leziuni de dimensiune mică sau în cazul celor care prezintă comorbidități asociate importante. Tratamentul principal rămâne în continuare chirurgia extensivă, cu rezecții largi și de multe ori repetate.

*Concluzii:* Condilomatoza gigantă reprezintă o provocare din punct de vedere chirurgical, necesitând intervenții chirurgicale laborioase care trebuie să respecte atât principiile oncologice, cât și o refacere cât mai anatomică a structurilor. Raritatea afecțiunii face ca, în prezent, existența unui protocol standardizat de tratament să fie un lucru greu de atins. Chirurgia radicală cu exereza largă a zonelor implicate rămâne încă „gold standard-ul” terapeutic. Alte forme de tratament oferă rezultate contradictorii și nu prezintă încă importanță statistică, fiind aplicate unor grupuri mici de pacienți. Dată fiind rata mare de recurență, o urmărire îndelungată și atentă a pacienților este imperios necesară.

**Cuvinte cheie:** boala Buschke-Löwenstein, excizie largă, carcinom verucos

Corresponding author: Arsenie Dan Spînu, MD

“Dr. Carol Davila” Central Military, Emergency University Hospital Bucharest  
88 Mircea Vulcanescu Street, sector 1, Bucharest, Romania

E-mail: dan.spinu@yahoo.co.uk