

Chirurgia conservatoare - echilibru între un aspect cosmetic bun și controlul local al bolii în neoplasmul de sân incipient

G. Gogescu, Ș. Marinescu, E. Brătucu

First General and Oncological Surgery Clinic, Bucharest Oncology Institute, Romania

Rezumat

Noile achiziții în studiul neoplasmului de sân, bazate pe mai multe studii retrospective și prospective, au dus, în ultimile decenii, la posibilitatea tratamentului conservator pentru cancerul de sân (breast conserving therapy - BCT) din stadii incipiente. Incepând din 1996, o singură echipă chirurgicală, pe lângă altele, din Institutul Oncologic București, a practicat BCT la 497 pacienți din totalul de 2256 bolnave cu neoplasm de sân tratate. Protocolul de lucru a constatat în excizia tumorii în limite de siguranță-examen histopatologic intraoperator, recupe de pe toți peretii cavității restante, cu examen histo-patologic intraoperator, limfadenectomie axilară, urmată obligatoriu de iradierea întregului sân, cu sau fără tratament adjuvant sistemic sau hormonal. Am avut 38 de pacienți care au dezvoltat o recidivă locală, din care 14 în primii 5 ani. În acest articol arătăm rezultatele obținute prin BCT, ca suport în favoarea acestui mod de tratament adecvat pacienților cu neoplasm al sânelui în stadiile incipiente, cu rezultate estetice net superioare mastectomiei.

Cuvinte cheie: neoplasm de sân, tratament conservator, rezultat estetic

Corresponding author: Gabriel Gogescu, MD

First General and Oncological Surgery Clinic

Bucharest Oncology Institute, Romania

E-mail: gabriel.gogescu@yahoo.com