

Migrarea gastrică transmurală a protezei Dual-sided PTFE/ePTFEE după intervenție laparoscopică pentru hernie hiatală recurentă cu disfagie: prezentare de caz

D. Acín-Gándara¹, C. Miliari-Molina¹, J.A. Carneros-Martín², J. Martínez-Piñeiro¹, M. De Vega Irañeta¹, F. Pereira-Pérez¹

¹Department of General and Digestive Surgery. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, Spain

²Department of Gastroenterology. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, Spain

Rezumat

Numeroase studii au demonstrat faptul că utilizarea fundoplicaturii laparoscopice în tratamentul herniei hiatale este fezabilă și sigură dar totodată poate fi grevată de o rată a recurenței care poate ajunge la 42%. Aplicarea unei plase la nivelul hiatusului reduce numărul de recurențe, dar este asociată cu o serie de complicații specifice. Printre acestea se numără fibroza severă la nivelul hiatusului, eroziunea peretelui intestinal, stenozele esofagiene, migrarea plasei în lumenul tractului gastro-intestinal superior și perforațiile esofagiene. Prezentarea de caz se referă la eroziunea tardivă cu migrare transmurală gastrică completă a plasei utilizate la protezarea hiatusului esofagian. În asemenea situații pot fi necesare intervenții chirurgicale complexe. În acest caz intervenția chirurgicală a putut fi evitată datorită migrării complete a plasei în lumen. Utilizarea plaselor în chirurgia laparoscopică a herniilor hiatale trebuie să fie foarte selectivă și să țină cont de experiența operatorului, anatomia hiatală și simptomatologia pacientului.

Cuvinte cheie: hernie paraesofagiană, disfagie, laparoscopie, chirurgie antireflux, închidere prostetică a defectului hiatal

Corresponding author: Débora Acín Gándara, MD, PhD.

Department of Surgery

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Avda. De España nº 8. Esc 3

3ºB. Pozuelo de Alarcón. 28224. Madrid, Spain

E-mail: abumessina@hotmail.com

debora.acin@salud.madrid.org