

Chist dermoid retrorectal manifestat ca fistulă periană extrasfincteriană - prezentare de caz

A. Karagjozov¹, I. Milev², S. Antovic¹, E. Kadri¹

¹Clinic of Digestive Surgery, Medical Faculty, Skopje, Republic of Macedonia

²Department of Surgery, Clinical Hospital, Štip, Republic of Macedonia

Rezumat

Tumorile retrorectale sunt entități patologice foarte rare, dar bine definite, în literatura de specialitate. De asemenea, o fistula extrasfincteriană este o formă foarte rară de fistulă perianală, ceea ce face cazul nostru foarte neobișnuit și rar, în special prin faptul că aceasta a fost tratată cu succes cu prima operație și fără formarea unei stomii de protecție. Pacientul a fost tratat în spital în primă fază pentru un abces retrorectal care a generat o ruptură spontană în spațiul postanal. Din cauza drenării constante de conținut purulent din deschiderea postanală în următoarele luni, s-au efectuat RMN și fistulografie, care au înregistrat o formațiune chistică în spațiul retrorectal cu formare de fistulă ce comunică cu rectul de mai sus și complet separată de aparatul sfincterian. Ulterior pacientul a fost internat pentru tratament definitiv. Operația a fost efectuată cu pacientul înclinat, în poziție de briceag. A fost efectuată excizia completă a chistului împreună cu fistula și rectul a fost suturat în dublu strat cu suturi resorbabile ușor separate. Rana a fost lăsată deschisă și pacientul a fost externat în ziua a 5-a postoperator. După aproximativ zece luni defecația este normală, rana este închisă și nu există semne de inflamație și secreție la nivel local.

Cuvinte cheie: fistula extrasfincteriană, chist retrorectal, excizie, sutură

Corresponding author: Ilija Milev, MD

Department of Surgery

Clinical hospital Štip, Republic of Macedonia

E-mail: ilijamilev@yahoo.com