

Fenotipul morfoclinic al cancerului paratiroidian. Consecințe terapeutice și prognostice

M.R. Diaconescu¹, M. Glod¹, I. Costea¹, M. Grigorovici¹, S. Diaconescu²

¹IVth Surgical Clinic, ²Vth Pediatric Clinic

“Gr T Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

Rezumat

Cancerle paratiroidiene (CP) sunt cauze rare dar “devastatoare” ale hiperparatiroidismului primar (HP), diagnosticate cel mai adesea fortuit și cu o confirmare histologică uneori îndoelnică având chiar după un tratament chirurgical bine condus, o evoluție și un prognostic capricios. Sunt prezentate patru neoplasme paratiroidiene din care trei cancere autentice și un adenom paratiroidian atipic (APA). Am înregistrat trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 32-49 (medie 44) ani. În trei cazuri CP a fost asociat cu HP primar și într-un caz a apărut în cadrul HP renal. Toți pacienții au prezentat fenomenele clinice și biochimice severe produse de hipercalcemie cu o intensitate crescută a simptomatologiei renale, osteoarticulare, musculare sau nervoase, iar într-un caz s-au adăugat manifestările uremice. În două cazuri (unul fiind APA) diagnosticul a fost suspectat pre sau intraoperator, în celelalte două fiind stabilit prin stigmatul de malignitate relevat de examenul la parafină. În toate observațiile s-a practicat exereza în bloc a tumorii cu lobul tiroidian adiacent. Două cazuri (între care și adenomul atipic) au prezentat o vindecare stabilă în timp, în celelalte două înregistrându-se decese la circa 14 luni de la operație. Observațiile noastre, puține la număr, subliniază diversitatea clinică, evolutivă și prognostică a CP care se adaugă dificultăților de diagnostic al acestor leziuni care trebuie evocate în orice condiții suspecte pentru efectuarea unei exereze cu intenție radicală, singura care poate asigura vindecarea.

Cuvinte cheie: cancer paratiroidian, hiperparatiroidism, chirurgie radicală

Corresponding author: Mihai Glod, MD

1, Garabet Ibraileanu str, 700507 Romania

E-mail: mihai_glod@yahoo.com