

Sacropexia cu meșă pentru rectocel voluminos pe cale laparoscopică

R. Vizeteu, N. Iordache, D. Andrei

Department of General Surgery, "St. John" Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Rectocelul reprezintă o herniere a rectului printr-un defect al fasciei rectovaginale care apare ca o bombare la nivelul peretelui vaginal posterior. Tratamentul chirurgical cuprinde numeroase procedee care se pot efectua prin patru tipuri de abord: transvaginal, transanal, transperineal și transabdominal. Cazurile de rectocel voluminos sunt rare și reprezintă de multe ori o provocare chirurgicală. Doar două dintre cele patru tipuri de abord s-au dovedit fezabile pentru rezolvarea unui rectocel voluminos, cel transvaginal și cel transabdominal. Autorii propun pentru rezolvarea acestor cazuri tehnica sacropexiei cu meșă realizată prin abord laparoscopic. Procedeu presupune decolarea retrorectală și separarea rectovaginală până la planșeul pelvin, urmate de o rectovaginopexie la promontoriu folosind o meșă de polipropilenă cu 2 brațe în formă de Y. Unul dintre brațele meșei este fixat la peretele rectal anterior cu patru fire de sutură iar celalalt braț este suturat la peretele vaginal posterior. Capătul meșei este fixat la promontoriu. Se realizează astfel ancorarea rectului prolabat și a fundului de sac posterior vaginal la ligamentul sacrat, meșa de polipropilenă substituind fascia rectovaginală deteriorată. Principalul simptom care a fost urmărit, dificultatea la defecație, s-a ameliorat semnificativ, nicio pacientă nemaifiind nevoită să recurga la manevre digitale pentru evacuarea rectului. Rezultatele bune ale experienței inițiale ne fac să credem că acest procedeu reprezintă o soluție tehnică atractivă pentru rezolvarea acestor cazuri dificile.

Cuvinte cheie: rectocel voluminos, sacropexie cu meșă, laparoscopie

Corresponding author: Radu Vizeteu, MD, PhD

Department of General Surgery

"St. John" Hospital, Bucharest, Romania

13 Vitan Barzesti, 042122

E-mail: rvizeteu@yahoo.com