

Traumatism pancreatic penetrant de grad mare - prezentare de caz și analiza literaturii

I. Negoî^{1,2}, S. Paun^{1,2}, B. Stoica², I. Tanase², S. Hostiuc^{1,3}, M. Beuran^{1,2}

¹”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²Emergency Hospital of Bucharest, Romania

³”Mina Minovici” National Institute of Legal Medicine, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Traumatismele pancreatice, din fericire rar întâlnite, se asociază cu multiple leziuni intraabdominale și prezintă o morbiditate și o mortalitate semnificativă. Scopul acestui studiu este de sublinia morbiditatea semnificativă asociată traumatismelor pancreatice de grad crescut.

Prezentare de caz: Pacientă de sex feminin, 36 de ani, victima unui traumatism pancreatic penetrant secundar violenței domestice, se internează prin transfer de la un spital județean, unde au fost efectuate multiple laparotomii. În departamentul de urgență pacienta este instabilă hemodinamic și prezintă insuficiență multiplă de organe. Examenul clinic abdominal relevă eviscerație blocată, cu exteriorizarea masivă de suc pancreatic la nivelul plăgii postoperatorii și la nivelul plăgilor penetrante din flancul drept. Computer Tomografia de urgență a evidențiat multiple colecții intraabdominale, cu lacerarea ficatului și rinichiului drept. S-a decis relaparotomia. După visceroliză și lavaj peritoneal cu evacuarea colecțiilor intra-peritoneale, explorarea a evidențiat o laceratie profundă la nivelul capului pancreatic, cu exteriorizarea activă de lichid pancreatic, elemente ce se corelează cu o leziune de gradul IV. Intervenția s-a încheiat prin drenajul larg al bursei omentale și al cavității peritoneale mari. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienta prezentând o fistula pancreatică externă managerizată conservator. Externarea s-a realizat la 35 de zile.

Concluzii: Traumatismele pancreatice de grad crescut se asociază cu o morbiditate semnificativă. Drenajul eficient al leziunilor pancreatice cefalice și managerizarea pacienților în centre cu volum crescut în chirurgie pancreatică crește semnificativ rata supraviețuirii.

Cuvinte cheie: politraumatism, penetrant, pancreas