

Chistadenocarcinom papilar seros peritoneal primar - o formă rară de neoplazie

S.K. Sahu, S. Agrawal, N. Shirazi, H. Kapruwan, P. Dasgupta, D. Ghildiyal, S.N. Singh

Department of General Surgery, Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Rama Himalayan University, Post - Doiwala, Dt- Dehradun, Uttarakhand, India

Rezumat

Carcinomul papilar seros peritoneal este o formă rară de neoplazie primară, ce afectează difuz peritoneul abdominal și pelvin. Cancerale ovariene epiteliale și cancerale peritoneale primare au originea în epiteliul germinal comun, dezvoltat din epiteliul celomic. Datorită unei origini embrionare comune a ovarului și peritoneului, cancerale de ovar și carcinomul peritoneal primar prezintă multiple similarități histologice. Cu toate acestea, incidența carcinomului seros peritoneal primar este mult mai scăzută decât a cancerului ovarian epitelial și se întâlnește cel mai frecvent la femei în vârstă. Stadiile incipiente de boală pot fi asimptomatice; simptomele apărute în stadiile avansate includ: distensie abdominală, formațiune tumorală abdominală, durere abdominală cu caracter nespecific, vărsături și dispnee, ca urmare a ascitei masive. Pacienții diagnosticați cu carcinom papilar seros peritoneal primar sunt tratați pe baza aceleiași stadializări și aceluiași abordări chirurgicale și chimioterapice aplicate în cazul cancerului ovarian epitelial datorită similitudinilor manifestărilor biologice.

Cuvinte cheie: carcinom papilar seros peritoneal primar, cancer ovarian epitelial, epiteliu celomic