

Mobilizare laparoscopică a unui lambou de epiploon pentru o supurație de triunghi Scarpa după infecție de proteză vasculară

P.V.H. Boțianu¹, A.M. Boțianu¹, R. Chirtes², A. Bacarea³

¹University of Medicine and Pharmacy from Tirgu-Mures, Romania, Surgery IV Discipline, M5 Department

²Surgical Clinic II, Mures Clinical County Hospital, Romania

³University of Medicine and Pharmacy from Tirgu-Mures, Romania, Department of Physiopathology

Rezumat

Prezentăm un caz de mobilizare laparoscopică a unui lambou de epiploon (vase epiploice stângi) care a fost folosit pentru rezolvarea unei infecții cronice la nivelul triunghiului Scarpa după o infecție de proteză vasculară (acoperire petec de pericard bovin – angioplastie pentru închiderea defectului rezultat după excizia protezei). Intervenția a durat 90 de minute și a fost efectuată folosind 3 trocare și instrumente laparoscopice standard. Evoluția postoperatorie imediată a fost favorabilă, cu reluarea tranzitului la 12 ore postoperator și vindecarea plăgii; pacientul a decedat după 9 luni datorită unor complicații la membrul contralateral. În cazurile cu anatomie favorabilă, mobilizarea laparoscopică a epiploonului este extrem de ușoară, fiind asociată cu o recuperare rapidă și reducerea morbidității.

Cuvinte cheie: epiploon, mobilizare laparoscopică, proteză vasculară, infecție