

Colecistectomie laparoscopică pentru un pacient cu șunt lumboperitoneal: caz rar

Roberts Rumba¹, Andrejs Vanags², Ilze Strumfa³, Andrejs Pupkevics⁴, Maris Pavars⁴

¹Faculty of Medicine, Riga Stradins University, Riga, Latvia

²Department of Surgery, Riga Stradins University, Riga, Latvia

³Department of Pathology, Riga Stradins University, Riga, Latvia

⁴Clinics of Surgery, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia

Rezumat

Un factor rar care poate duce la complicații în cursul perioperatoriu al colecistectomiei laparoscopice este poziționarea prealabilă a unui șunt lumboperitoneal (LP). Până în prezent au fost publicate doar două articole care să prezinte această situație. În cadrul acestei lucrări noi raportăm un pacient de gen feminin, în vârstă de 41 de ani cu boala Gall Stone și poziționare de șunt lumboperitoneal în anul precedent datorită unei hipertensiuni intracraniene idiopatice. Acesta este un sindrom de presiune intracraniană ridicată fără niciun fel de cauză cunoscută care afectează în general tinerele femei obeze. Pacientul este operat folosindu-se un port standard de poziționare și insuflare peritoneală. Perioada postoperatorie a fost favorabilă iar pacienta a fost externată la scurt timp după procedură. Datorită creșterii incidenței și prevalenței obezității, numărul de pacienți chirurgicali cu caracter general cu șunt LP cel mai probabil va crește. În baza experienței noastre și a dovezilor din literatura de specialitate concluzionăm că efectuarea unei laparoscopii pentru un pacient cu șunt LP este o operațiune sigură.

Cuvinte cheie: șunt lumboperitoneal, hipertensiune intra- craniană idiopatică, colecistectomie laparoscopică