

Teratom matur ovarian bilateral asociat cu carcinosarcom – asociere întâmplătoare sau determinism etiopatogenic? - prezentare de caz

Rodica Birla, Elena-Roxana Catanescu, Andrei Caragui, Silviu Constantinoiu

Department of General and Esophageal Surgery, Excellence Center for Esophageal Surgery, Sf. Maria Hospital, Bucharest, Romania

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Surgery Department, Bucharest, Romania

Rezumat

Carcinosarcomul este o forma rară de cancer ovarian cu origine mixtă, iar asocierea sa cu teratomul matur este extrem de rară. Prezentăm cazul pacientei T.M. în vârstă de 67 ani, internată în clinică în 15.05.2016, F.O. 4877 pentru creșterea în volum a abdomenului. La internare, pacienta afebrilă, conștientă, cooperantă, echilibrată cardio-respirator, cu abdomen destins de volum, matitate accentuată pe flancuri, semnul valului pozitiv, bioumoral în limite normale cu excepția: acid uric seric = 6.64 mg/dl, glicemie serică = 113.7 mg/dl, proteine serice totale = 8.65 g/dl, raportul albumină/globulină subunitar, CRP 33.63 mg/l, sideremie 51 ug/dl, CA 125 = 588.4 UI. Ecografia abdominală: cantitate mare de lichid decliv și perihepatic și multiple formațiuni tumorale cu transformare chistică la nivelul abdomenului și pelvisului. Examen CT descrie multiple mase tisulare localizate intraperitoneal abdomino-pelvin, manșonate în epanșament lichidian, infiltrative, cu efect de masă pe lumenle digestive, fără obstrucție vizibilă CT. Tratamentul chirurgical a constat în evacuarea lichidului de ascită, excizia formațiunilor tumorale din marele epiploon, a formațiunilor tumorale din ligamentul gastro-colic, epiploonectomie, anexectomie bilaterală și histerectomie totală. Evoluție postoperatorie simplă. Examenul histopatologic confirmă diagnosticul de carcinosarcom ovarian bilateral asociat cu teratom matur tridermic (prezența zonelor de țesut cerebral, asociat cu țesut cartilaginos, epitelii de tip tranzițional, epitelii de tip tubar, stromă de tip endometrial, țesut adipos). IHC confirmă compatibilitatea cu diagnosticul de carcinosarcom ovarian (tumoră malignă mixtă mulleriană). Pacienta a urmat poli-chimioterapie adjuvantă. Asocierea teratomului cu elemente carcinosarcomatoase conferă cazului un prognostic infaust.

Cuvinte cheie: teratom matur, carcinosarcom ovarian