

Suprarenalectomia parțial laparoscopică

Adrian Miron^{1,2}, Cosmin Giulea^{1,2}, Mihai Nădrăgea¹, Octavian Enciu^{1,2}

¹Department of Surgery, Elias University Emergency Hospital, Bucharest, Romania

²Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Department 10 – Surgery, Bucharest, Romania

Rezumat

Suprarenalectomia laparoscopică a devenit gold standard pentru afecțiunile suprarenalei, de la incidentalom până la cancer. Suprarenalectomia parțială este greu de acceptat din cauza dificultăților tehnice și a riscurilor hemoragie, nefiind stabilit un consens. Pe de altă parte, în cazuri selecționate de tumori benigne, suprarenalectomia poate fi excesivă, rezecțiile parțiale fiind perfect justificate cu risc hemoragic scăzut. Pentru tumori secretante de dimensiuni sub 3 cm, cu localizare anterioară sau laterală, suprarenalectomia parțială poate fi indicată. Reperele principale sunt reprezentate de identificarea adenomului, conservarea țesutului glandular restant împreună cu sursele vasculare și disecția precisă cu menținerea spațiului de clivaj între adenom și restul parenchimului. Suprarenalectomia parțial laparoscopică este fezabilă și eficientă pentru tratamentul tumorilor de mici dimensiuni mai ales în localizările bilaterale. Aceste avantaje sunt contrabalansate de o tehnică chirurgicală mai dificilă.

Cuvinte cheie: chirurgie laparoscopică, suprarenalectomie, rezecție supra-renală parțială