

Tratamentul chirurgical al pseudoanevrismelor arterei splenice ce prezintă comunicare cu tracul digestiv - două prezentări de caz

Mihai Adrian Eftimie, Oana Maria Stanciulea, Leonard David, Vasile Lungu, Simona Dima,
Iulian Mosteanu, Luiza Tirca, Irinel Popescu
Center for General Surgery and Liver Transplantation "Dan Setlacec", Fundeni Clinical Institute,
Bucharest, Romania

Rezumat

Spleno-pancreatectomia efectuată pentru tratamentul pseudo-anevrismelor arterei splenice localizate la nivelul unui pseudochist pancreatic ce comunică cu tubul digestiv (stomac sau colon) reprezintă una din indicațiile rare, puține astfel de proceduri fiind descrise în literatură. Tratamentul pseudo-anevrismelor peri-pancreatice este complex și dificil. Tratamentul chirurgical este curativ și poate include rezecția altor organe. Intervențiile chirurgicale pot fi executate în condiții de urgență, dacă pacientul prezintă sângerare cataclismică sau în condiții electivă în cazul în care diagnosticul se pune accidental sau dacă pacientul reușește să depășească episodul inițial de sângerare. În această lucrare prezentăm două cazuri de pseudochist pancreatic ce asociază pseudo-anevrism al arterei splenice și fistula cu tubul digestiv (comunicare pseudochisto-colonică și pseudochisto-gastrică). Amândoi pacienții sunt bărbați, cunoscuți cu pancreatită cronică și pseudochiste pancreatice. Primul pacient a fost operat electiv după investigații amănunțite. Cealaltă intervenție chirurgicală a fost efectuată în condiții de urgență pentru a controla un episod de sângerare cataclismică. Concluzionăm ca abordul chirurgical rămâne principala metodă pentru tratamentul acestor cazuri. Poate fi folosit ca primă linie de tratament sau secundar abordului endovascular.

Cuvinte cheie: splenopancreatectomie, pseudoanevrism, arteră splenică, rezecție pancreatică