

Care este valoarea exciziei complete a mezopancreasului în carcinomul ductal pancreatic? Analiza datelor din literatură

Irinel Popescu^{1,2}, Traian Dumitrascu^{1,3}

¹“Dan Setlacec” Center of General Surgery and Liver Transplantation, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania

²“Titu Maiorescu” University, Bucharest, Romania

³“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Carcinomul ductal pancreatic (PDAC) este o afecțiune cu prognostic infaust. Rezeckia pancreatică reprezintă singura șansă de supraviețuire pe termen lung în cazul unui pacient diagnosticat cu PDAC. Recidiva după chirurgia cu viză curativă pentru PDAC este frecventă și se datorează în cea mai mare parte marginilor de rezeckie pozitive: marginea medială/ de la nivelul arterei mezenterice superioare cel mai frecvent. Excizia completă a mezopancreasului (TMpE) a fost propusă în analogie cu excizia totală a mezorectului în cancerul rectal, pentru un mai bun control al recidivei loco-regionale. Lucrarea își propune să discute datele existente la momentul actual în literatura de specialitate privind valoarea TMpE în PDAC.

Cuvinte cheie: carcinom ductal pancreatic, pancreatectomie, mezopancreas, excizie completă de mezopancreas, recidivă, supraviețuire