

Cancer mamar cu metastaze ale colului uterin, cu sângerare vaginală anormală în timpul chimioterapiei: studiu de caz și analiza literaturii

A Saad Abdalla Al-Zawi, Anita Lazarevska, Mohammed Murwan Omer, Elizabeth Tan, Amira Asaad, Sharlini Sathananthan
Basildon & Thurrock University Hospital, Essex, UK

Rezumat

Cele mai întâlnite metastaze ale cancerului mamar invaziv sunt metastazele pulmonare, pancreatice, osoase și cerebrale. Localizările mai puțin frecvente includ tractul gastrointestinal, pancreasul, splina, tiroida, glanda suprarenală, rinichii, cordul și tractul genital feminin. Uterul este o localizare rară pentru metastaze, cu atât mai mult pentru metastaze izolate. Alte localizări ale metastazelor uterine, cu surse extragenitale, includ colonul, stomacul, pancreasul, plămânii, colecistul, melanomul cutanat, vezica urinară și tiroida. Raritatea cancerului mamar cu metastaze ale colului uterin poate fi explicată prin faptul că acesta din urmă are o mică rezervă de sânge și un sistem de drenaj limfatic aferent individuale. Diagnosticarea metastazelor colului uterin înainte de descoperirea bolii mamare primare este rară. Metastazele carcinomului lobular invaziv în sistemul genital feminin sunt mai frecvente decât carcinomul

ductal invaziv. Această lucrare prezintă un caz cu cancer mamar și metastaze ale colului uterin.

Cuvinte cheie: adenocarcinom mamar, cancer de col uterin, Citokeratină 7