

Managementul chirurgical al complicațiilor piciorului diabetic neuropat

Dragoș Eugen Georgescu^{1,2}, Petronel Mustața^{1,2}, Octavian Mihalache^{1,2}, Florin Bobircă^{1,2}, Alexandra Agache^{1,2}, Teodor Florin Georgescu², Ovidiu Chiriac¹, Vlad Marin¹, Horia Doran^{1,2}, Traian Pătrașcu^{1,2}

¹“I. Juvara” Surgical Department, “Dr. I. Cantacuzino” Clinical Hospital, Bucharest

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Rezumat

Introducere: Complicațiile piciorului diabetic sunt rezultatul asocierii dintre boala vasculară periferică, neuropatie și un proces de vindecare precar. Neuropatia periferică observată la diabetici afectează toate componentele sistemului nervos, senzitiv, motor și autonom, fiecare contribuind la apariția ulcerărilor piciorului. Pe fondul neuropatiei apar modificări musculo scheletale și ale arhitecturii piciorului conducând la deformări severe. Manifestarea clinică a acestor complicații variază de la leziuni simple până la entități complexe amenințătoare de pierderea membrului pelvin sau chiar de viață (1,2).

Material și Metodă: În Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino din București sunt internați și tratați anual un număr semnificativ de pacienți cu leziuni de tip picior diabetic, 40% având manifestări clinice de neuropatie diabetică. În 2017 dintr-un total de 448 de pacienți, internați pentru complicații ale diabetului zaharat, am efectuat o analiză retrospectivă a 150 pacienți consecutivi care au suferit intervenții chirurgicale pentru leziuni de picior diabetic cu predominanța neuropatiei.

Rezultate: Pacienții analizați au avut o evoluție postoperatorie favorabilă, beneficiind de suport circulator. Rezecția de raze a fost intervenția chirurgicală preferată. Amputația majoră a fost efectuată la 10% din pacienți, cu gangrene extensive și sepsis, amputația de gambă fiind preferată în toate situațiile.

Concluzii: Managementul chirurgical al acestor pacienți este delicat, de multe ori fiind necesar un abord multidisciplinar. O atitudine terapeutică bine condusă poate face diferența între preservarea sau pierderea membrului pelvin.

Cuvinte cheie: neuropatie, diabet zaharat, ulceratie, Charcot