

Revascularizarea chirurgicală în ischemia cronică ce amenință viabilitatea membrului pelvin la pacienții diabetici

Cristina Neagu¹, Alexandra Buzea², Alexandra Agache³, Dragoș Georgescu³, Traian Pătrașcu³

¹Diabetic Foot Compartment, "I. Cantacuzino" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

²"C.C. Iliescu" Emergency Institute for Cardiovascular Disease, Bucharest, Romania

³1st General Surgery Clinique, "I. Cantacuzino" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Diabetul zaharat este una din bolile cronice care a prezentat o creștere constantă a numărului de pacienți în ultimele decenii. După diagnosticul diabetului, evoluția către amputația membrului se face pas cu pas prin instalarea neuropatiei, apariția ulcerului, infectarea acestuia și existența arteriopatiei care, prin statusul ischemic al membrului, împiedică vindecarea. Prin refacerea fluxului arterial al membrului se rezolvă una dintre cauzele de apariție a leziunilor trofice, și anume ischemia.

Material și Metode: În cadrul Clinicii de Chirurgie a Spitalului Clinic Dr I Cantacuzino – Compartimentul Chirurgie Reparatrice a Piciorului Diabetic s-au efectuat primele revascularizări chirurgicale în urmă cu aproximativ 5 ani. În tot acest timp am depus eforturi constante pentru a scădea numărul de amputații majore prin diversificarea intervențiilor dedicate aproape în exclusivitate pacienților cu ulcer al piciorului diabetic.

Rezultate: Numărul amputațiilor majore a scăzut în urma intervențiilor de revascularizare și am obținut vindecarea completă a ulcerelor și o extremitate funcțională. Am avut 80 de pacienți în observație care au fost supuși intervențiilor de revascularizare, cu vârste cuprinse între 40 și 75 ani, 46 bărbați și 34 femei. Toți sunt diabetici cu ischemie critică și comorbidități variate: 24% hipertensiune arterială, 14% polineuropatie, 12% dislipidemie. Complicațiile apărute în primul an de urmărire postoperatorie au constat în 14 cazuri de tromboza de graft și doar 6 cazuri de amputații majore.

Concluzii: Înainte de a încerca orice tip de amputație, majoră sau minoră, după controlul infecției locale prin tratament, debridare excizională sau pansamente locale, și după evaluarea vasculară, este crucială restabilirea fluxului arterial.

Cuvinte cheie: diabet zaharat, picior diabetic, arteriopatie, ischemie critică, ischemie cronică ce amenință viabilitatea membrului, amputație