

Importanța factorului nutrițional și a stadiului bolii în fistule postoperatorii la pacienții cu cancer gastric

Virgiliu M. Prunoiu^{1,2}, Augustin Marian Marincas^{1,2}, Carmen Pantis², Adriana Bene²,
Eugen Bratucu^{1,2}, Sinziana Ionescu^{1,2}, Alexandru Grigorescu²

¹“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²Department of Surgery, Bucharest Oncology Institute, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: În cancerul gastric sunt factori generali și locali multipli care pot determina fistulelor postoperatorii. În studiul de față am propus analiza rolului stării nutriționale preoperatorii și al terapiei nutriționale împreună cu stadiul bolii, vârsta și sexul pacienților în cazul apariției fistulelor.

Material și Metodă: Acest studiu retrospectiv a inclus 158 de pacienți operați pentru cancer gastric în Clinica de Chirurgie în perioada 2010-2016, în care am analizat incidența fistulei anastomotice.

Rezultate: Incidența globală a fistulelor a fost de 11%. Dintre cei 30 de pacienți cu pierdere în greutate și nutriție parenterală pre și post-parenterală parenterală, fistula a apărut la 13%, dintre 36 pacienți cu pierdere în greutate și nutriție parenterală numai postoperator, 14%, din 24 de pacienți cu pierdere în greutate și fără terapie nutrițională, au făcut fistulă 21%, iar 68 de pacienți fără pierdere în greutate au făcut fistulă numai 6%.

Concluzie: În concluzie, incidența fistulei postoperatorie a fost mai mare în stadiile avansate de boală ($p=0.027$) precum și la pacienții cu vârsta de peste 70 de ani. Putem spune că terapia nutrițională a condus la scăderea numărului de fistule ($p=0.047$)

Cuvinte cheie: cancer gastric, nutriție, oncologie geriatrică