

Când ne-am putea aștepta la un răspuns complet la tratamentul neoadjuvant pentru pacienții cu cancer de rect local avansat?

Mihai-Teodor Georgescu^{1,2}, Traian Patrascu^{1,3}, Luiza Georgia Serbanescu¹,
Rodica Maricela Anghel^{1,2}, Laurentia Nicoleta Gales^{1,2}, Florin Teodor Georgescu^{1,4},
Radu Iulian Mitrica^{1,2}, Dragos Eugen Georgescu^{1,3}

¹“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²2nd Department of Radiotherapy, “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Institutue of Oncology, Bucharest, Romania

³1st Department of Surgery, “Dr. Ion Cantacuzino” Hospital, Bucharest, Romania

⁴Department of Surgery, Bucharest Emergency Hospital, Romania

Rezumat

Această revizuire a literaturii recent publicate își propune să rezume datele publicate cu privire la răspunsul patologic complet în urma tratamentului neoadjuvant la pacienții cu cancer rectal avansat local biopsiat. Articolele publicate referitoare la pacienții cu cancer rectal pCR au fost identificate prin utilizarea căutării în baza de date PubMed. Au fost selectate unsprezece articole relevante, pe baza tumorii, a tratamentului și a raportării caracteristicilor pacientului. În concluzie, pacienții cu cancer rectal cu cele mai mari șanse de răspuns clinic sau patologic complet la tratamentul neoadjuvant sunt bărbați, cu vârsta de aproximativ 60 de ani, diagnosticați cu cancer rectal local diferențiat bine sau moderat.

Cuvinte cheie: rect, neoadjuvant, chimiodioterapie, răspuns complet