

Tratamentul chirurgical al sânului și al axilei după terapie neoadjuvantă

Dan Hershko

Department of Surgery A, Emek Medical Center, Afula, Israel

Rezumat

Indicațiile privind utilizarea chimioterapiei neoadjuvante (NAC) pentru gestionarea cancerului de sân s-au extins foarte mult în ultimii ani. Destinată inițial pentru cancerul de sân inoperabil, această modalitate a devenit apoi standardul de îngrijire pentru cancerul avansat local. Acest tratament a permis efectuarea rezecțiilor chirurgicale cu margini de siguranță și, în cazul multor pacienți cu tumori voluminoase, a permis intervenția chirurgicală de conservare a sânilor, cu evitarea mastectomiei. Pe măsură ce experiența clinică cu NAC a crescut odată cu introducerea de medicamente noi și cu o mai bună înțelegere a biologiei tumorale, indicațiile pentru utilizarea sa au devenit și mai frecvente pentru tratamentul unor subtipuri de cancer mamar incipient. Mai mult, s-a constatat că utilizarea NAC determină scăderea necesității disecției ganglionare axilare la pacienți selectați ce prezintă inițial ganglioni limfatici pozitivi. Acest articol va analiza practica actuală și indicațiile NAC în cancerul de sân, precum și unele probleme controversate cu privire la tratamentul chirurgical al sânului și al axilei în urma tratamentului neoadjuvant.

Cuvinte cheie: cancer de sân, chimioterapie neoadjuvantă, intervenție chirurgicală de conservare a sânului, nodul santinelă, tratament biologic