

Adenopatii cu silicon și durere axilară recurentă după chirurgia de augmentare mamară cu implant - studiu de caz

Ciprian Cucoreanu¹, David Andras¹, Alexandra Caziuc¹, Vlad Fagarasan¹, Liliana Rogojan², Ciurea Anca³, George-Calin Dindelegan¹

¹1st Surgical Clinic, University of Medicine and Pharmacy Cluj Napoca, Romania

²Radiology and Imaging Department, University of Medicine and Pharmacy Cluj Napoca, Romania

³Anatomical Pathology Department, University of Medicine and Pharmacy Cluj Napoca, Romania

Rezumat

Introducere: Adenopatiile cu silicon (siliconoamele) sunt o complicație rară, secundară chirurgiei de augmentare mamară sau intervențiilor de reconstrucție mamară care utilizează implanturi de silicon. Etiologia acestor adenopatii este de cele mai multe ori multifactorială. Există însă o corelație strânsă între incidența de apariție a siliconoamelor și vechimea implantului mamar. Vom prezenta cazul unei paciente cu multiple adenopatii cu silicon extinse la nivel axilar, în scopul în care experiența noastră poate sensibiliza și poate fi de ajutor pentru stabilirea algoritmului de diagnostic și tratament al unor cazuri similare.

Expunerea cazului clinic: Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 41 de ani cu durere intensă în axila dreaptă, dezvoltată la un interval de aproximativ 20 de ani după intervenția de augmentare mamară bilaterală cu implanturi de silicon. În evoluția bolii tratamentul medicamentos analgezic a devenit inefficient iar durerea din ce în ce mai debilitantă. În urma examinării clinice amănunțite și a investigațiilor imagistice s-au decelat trei ganglioni limfatici axilari centrali cu aspect sugestiv pentru adenopatii cu silicon (prezența ecografică a semnelor "snowstorm"). S-a practicat excizia chirurgicală a leziunilor din axila dreaptă cu remisiune completă a durerii. Analiza histologică ulterioară a demonstrat prezența ganglionilor limfatici cu reacție granulomatoasă și care conțin particule de silicon.

Concluzie: Atât chirurgul generalist cât și chirurgul plastician trebuie să rămână atenți la această posibilitate diagnostică - siliconomul. Deși rară, adenopatia cu silicon poate fi cauzatoare de stres major și anxietate în rândul pacienților sau poate genera simptome locale cu impact semnificativ asupra stării de sănătate și a calității vieții. Întotdeauna sunt necesare investigații amănunțite pentru a putea exclude o etiologie malignă și pentru a putea oferi o strategie optimă de tratament.

Cuvinte cheie: adenopatie cu silicon, durere axilară, implant mamar, ruptura implantului mamar, reacție granulomatoasă