

Chiste hidatice hepatice multiple, prezentare de caz și review al literaturii de specialitate

Ioana Hălmăciu¹, Bogdan Andrei Suciu¹, Claudiu Molnar², Paul Cristian Russu³,
Vlad Olimpiu Butiurca³, Mariana Tilincă⁴, Simu Patricia⁵, Călin Molnar³

¹Department of Anatomy, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania

²Department of Obstetrics and Gynecology, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania

³Department of Surgery, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania

⁴Department of Diabetology, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania

⁵Department of Radiology, University County Hospital, Târgu Mureș, Romania

Rezumat

Introducere: Boala hidatică este o afecțiune parazitară produsă de *Echinococcus granulosus* care este des întâlnită în practica clinică. Cel mai frecvent chistele hidatice sunt localizate la nivelul ficatului, iar plămânul reprezintă cel de-al doilea organ în ceea ce privește frecvența localizării la acest nivel.

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 40 de ani care s-a prezentat în serviciul nostru cu diagnosticul de chiste hidatice pulmonare (2 chiste hidatice localizate la nivelul lobului superior și inferior stâng) și chiste hidatice hepatice multiple (10 chiste hidatice localizate la nivelul ambilor lobi hepatici. Inițial s-a intervenit chirurgical la nivel toracic, practicându-se rezecții pulmonare atipice de lob superior și inferior stâng. La 6 luni de la intervenția chirurgicală toracică s-a prezentat pentru tratamentul chirurgical al chistelor hidatice hepatice practicându-se chistectomii hepatice parțiale multiple, colecistectomie, drenaj Kehr (2 chiste hidatice hepatice prezentau fistule biliare). Evoluția post-operatorie a fost favorabilă, pacienta fiind externată în ziua a 10-a postoperator.

Concluzii: Chiar dacă, chistul hidatic hepatic reprezintă o boală aparent benignă, există în practica clinică cazuri complexe de ehinococoză diseminată care pot necesita tratament complex. Tratamentul chirurgical rămâne în continuare cea mai bună opțiune terapeutică în aceste cazuri. La acești bolnavi se impune o urmărire postoperatorie atentă pentru depistarea cazurilor de recidivă a chistului hidatic la nivel hepatic sau extrahepatic.

Cuvinte cheie: chiste hidatice hepatice multiple, tratament chirurgical