

Herniile inghinale - mai este loc pentru tehnicile clasice?

Horia Doran¹, Florin-Teodor Bobircă¹, Dan Dumitrescu², Mihai Pecie², Traian Pătrașcu¹

¹"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²"Dr. I. Cantacuzino" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Actualmente, rezolvarea chirurgicală a herniilor inghinale este obținută de regulă prin abord minim invaziv (TAPP sau TEP), cu avantajele sale bine-cunoscute. Cu toate acestea, tehnica Lichtenstein își menține indicațiile sale particulare.

Metodă: Am analizat retrospectiv 256 pacienți consecutivi, cărora li s-a efectuat operația Lichtenstein într-un interval de 5 ani (2015-2019), în Clinica de chirurgie a Spitalului Clinic "Dr. I. Cantacuzino". Marea majoritate a lor - 180 (74%) aveau 60 de ani sau mai mult, dintre care 105 (41%) - peste 70 de ani. Am notat prezența unor afecțiuni cardio-vasculare severe, a diabetului zaharat sau a altor co-morbidități semnificative la 128 de pacienți (50%).

Rezultate: 240 pacienți au evoluat favorabil, 12 au avut complicații locale, iar la 4 au apărut evenimente cardiace post-operatorii. 1 pacient a decedat în urma unui infarct miocardic masiv.

Concluzii: Tratatamentul chirurgical al herniilor inghinale trebuie să fie potrivit vârstei și status-ului biologic al pacienților; serviciile de chirurgie generală ar trebui să fie în măsură să ofere atât posibilitatea unui abord laparoscopic, cât și a unuia clasic.

Cuvinte-cheie: hernie inghinală, tehnica Lichtenstein