

Implantul splenic intraoamental – o încercare de reevaluare

Mircea Beuran¹, Mircea Dan Venter², Dana Paula Venter³, Constantin Oprescu², Sebastian Vâlcea⁴, Tiberiu Georgian Tănase²

¹Academy of Medical Sciences, full member

University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Department of Surgery, Bucharest, Romania

3rd Department of Surgery, Emergency Hospital Bucharest, Romania

²Department of Surgery, Emergency Clinical Hospital Bucharest, Romania

³Division of Pediatric Surgery, 2nd Department of Surgery, Children Emergency Hospital "Grigore Alexandrescu" Bucharest, Romania

⁴University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Department of Surgery, Bucharest, Romania

Rezumat

Riscul permanent al pacienților splenectomizați la complicații infecțioase, cea mai severă fiind overwhelming post splenectomy infection (OPSI) a determinat căutarea unor soluții care să diminueze aceste posibilități evolutive. Astfel, autotransplantul splenic intraoamental pare să fie o opțiune viabilă care, în viziunea unor autori, ar avea efecte benefice prin restabilirea (cel puțin parțială) a funcțiilor splinei. Articolul prezintă experiența actuală legată de această procedură (principii de tehnică chirurgicală, sediul implantelor, complicații, evaluare postprocedurală) în încercarea de a-l aduce/readuce în atenția chirurgilor de traumă /chirurgie generală. Procedura este simplă, rapidă și cu complicații minime/absente și trebuie aplicată după orice splenectomie posttraumatică.

Cuvinte cheie: trauma, splenectomy, splenic implants