

Managementul laparoscopic al prolapsului de organe pelvine: o serie de cazuri

Irina Nițu^{1,2}, Vasile Sârbu², Silvia Savin^{1,2}, Neacțu Sabina^{1,2}, Silvia Șerban¹, Stere Popescu^{1,2}, Teodor Ștefan Nițu^{1,2}

¹Department of General Surgery, Emergency Hospital of Constanta, Romania

²Ovidius University, Faculty of Medicine and Pharmacy Constanta, Romania

Rezumat

Introducere: Tulburările de statică pelvină au impact important asupra calității vieții pacientelor, constituind o reală problemă de sănătate publică, în ciuda faptului că nu sunt amenințătoare de viață. Managementul minim invaziv al prolapsului organelor pelvine prezintă numeroase avantaje, histeropexia și colpopexia laparoscopică fiind un standard cu beneficii reale: incizii minime, complicații postoperatorii reduse, timp de spitalizare mai scurt și o rată scăzută de recurență. Managementul laparoscopic a astfel de cazuri este recomandat, însă necesită echipe bine antrenate în chirurgia minim invazivă.

Prezentare de caz: Am prezentat o serie de cazuri de succes a două paciente cu histerocel de gradul III, respectiv prolaps de boltă vaginală care au fost tratate minim invaziv cu o histeropexie laparoscopică laterală, respectiv colpopexie laparoscopică laterală. Având în vedere beneficiile binecunoscute ale chirurgiei minim invazive, am ales o intervenție chirurgicală efectuată laparoscopic datorită impactului chirurgical mai mic și revenirii mai rapide la viața normală. Procedurile chirurgicale au fost efectuate cu succes, fără complicații, cu recuperare rapidă, fără recidivă.

Concluzii: histeropexia și colpopexia laparoscopică reprezintă proceduri chirurgicale sigure și eficiente la cazurile selecționate.

Cuvinte cheie: laparoscopie, histeropexie, colpopexie