

Rezultate funcționale și satisfacția pacienților după amputație abdominoperineală versus tehnici de preservare a aparatului sfincterian în cancerul rectal inferior: un studiu retrospectiv unicentric.

Andrei Chitul¹, Emilica Ciofic^{1,2}, Traean Burcoș^{1,2}, Daniel Cristian^{1,2}, Florin Grama^{1,2}

¹Department of General Surgery, Coltea Clinical Hospital, Bucharest, Romania

²Department of General Surgery, number 10, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: În chirurgia cancerului rectal, menținerea unui echilibru între controlul oncologic și păstrarea unei bune calități a vieții este esențială. Procedurile cu preservarea sfincterului anal pot oferi beneficii funcționale superioare, dar rezultatele variază în funcție de tehnica utilizată.

Metode: Studiul retrospectiv, observațional și unicentric a inclus 62 de pacienți diagnosticați cu adenocarcinom rectal localizat ≤ 5 cm de orificiul anal, operați între august 2022 și august 2024. Toți pacienții au primit tratament neo-adjuvant. Aceștia au fost repartizați în trei grupuri chirurgicale: amputație abdomino-perineală, anastomoză coloanală standard, sau anastomoză întârziată (Turnbull-Cutait). Evaluarea funcțională s-a realizat prin scorurile LARS și St Marks la 1, 6 și 12 luni postoperator. Satisfacția a fost apreciată prin interviuri telefonice.

Rezultate: 17 pacienți au suferit amputație, 10 au avut anastomoză standard, iar 35 anastomoză întârziată. Anastomoza standard a fost asociată cu scoruri funcționale semnificativ mai bune față de tehnica Turnbull-Cutait. Grupul cu amputație a prezentat incidență crescută a complicațiilor pulmonare și a inflamației persistente. 80% dintre pacienți s-au declarat mulțumiți la un an postoperator.

Concluzii: Toate tehnicile pot asigura o satisfacție ridicată, dar anastomoza coloanală standard oferă rezultate funcționale superioare. Alegerea intervenției trebuie personalizată și susținută de un consimțământ informat.

Cuvinte cheie: cancer de rect inferior, preservare sfincteriană, amputație de rect abdominoperineală, rezultate funcționale, satisfacția pacienților